

7 FOUR 7



Stolna vrsta

- ✓ Srednje rana sorta bijelog mesa
- ✓ ujednačeni dugi ovalni gomolji
- ✓ Visokorodna
- ✓ Pogodno za pranje
- ✓ Otpornost na PCN (Ro1)
- ✓ Lijepa pokožica



Karakteristike

Fiziologija

Boja pokožice	Svijetložuta
Boja mesa	Bijela
Oblik gomolja	Ovalno izdužen
Ujednačenost gomolja	6
% 35/65	67%
Gomolji po biljci	13
Dubina okaca	8
Grupa zrenja	6,8
Dormantnost	6
Skladištenje	6
Indeks modrica (0-50)	2
Mehanička oštećenja	7
Šuplje srce gomolja	9

Prinos - Kvaliteta

Relativni prinos	113
Sadržaj suhe tvari (UWW)	17,1% (307)
Kulinarški tip	AB
Nakon kuhanja, prom. boje	7
Boja prženja nakon pečenja	4
Boja prž. nakon skladištenja	3

Otpornosti

Plamenjača lista	3,7
Plamenjača gomolja	7,7
Obična krastavost	6,7
Prašna krastavost	7
Globodera Ro 1 (A)	9
Bradavičavost f1 (D1)	10
Modrice gomolja (TRV)	6,1
Aardappel Y-virus	4

Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

Količine sjemena i razmak biljaka - Gnojenje

Veličina	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.300	24-26
35/45 mm	2.300	28-30
45/50 mm	3.400	31-33
35/50 mm	2.700	29-31
50/60 mm rez	2.800	29-31

Uvijek brojite količinu gomolja! Teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje..

Gnojivo	%usporedno s standard	Primjena		
		1 st	2 nd	3 th
N	100	2/4	1/4	1/4
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	110	4/4		



- Pogodna na svim vrstima tla.
- Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
- Saditi na normalnu visinu u humku.
- Ne koristite K-klorid kao izvor kalija u proljeće.
- Čini se da na Metribuzin se nije pokazao osjetljiv.
- Započnite prskanje protiv Phytophthore pri 80% nicanja.
- Drugu primjenu N-gnojiva dati u vrijeme tuberizacije.
- Počnite špricati protiv Alternarie na vrijeme.
- Treća primjena N gnojiva oko cvatnje.
- Na vrijeme počnite prskati protiv Plamenjače gomolja.
- Nakon Desikacije, dopustiti pokožici gomolja da sazrije u polju prije vađenja.
- Nakon vađenja pobrinite se za dobru ventilaciju u skladištu dok se krumpir ne osuši.