



Stolna vrsta

- ✓ Rana sorta
- ✓ Visok prinos
 - ✓ Dobra otpornost na sušu
 - ✓ PCN otpornost (Ro1)
- ✓ Otpornost na bradavičavost (f1)



Karakteristike

Fiziologija

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Boja pokožice | Svijetložuta |
| Boja mesa | Svijetložuta |
| Oblik gomolja | Okrugli ovalni |
| Ujednačenost oblika gomolja | 7 |
| % 35/65 | 70% |
| Gomolji po biljci | 11 |
| Dubina okaca | 7 |
| Grupa zrenja | 7,6 |
| Dormantnost | 8 |
| Indeks modrica (0-50) | 1 |
| Mehanička oštećenja | 9 |

Prinos - Kvaliteta

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Relativni prinos | 107 |
| Sadržaj suhe tvari (UWW) | 16,8% (300) |
| Kulinarski tip | A |
| Nakon kuhanja, promjena boje | 7 |
| Boja pečenja nakon vađenja | 3 |
| Boja pečenja nakon skladištenja | 3 |

Otpornosti

| | |
|-------------------------|-----|
| Plamenjača lista | 5,2 |
| Plamenjača gomolja | 9 |
| Obična krastavost | 6 |
| Prašna krastavost | 7 |
| Globodera Ro 1 (A) | 9 |
| Bradavičavost f1 (D1) | 10 |
| Modrice gomolja g (TRV) | 8,3 |
| Virus Y | 6 |

Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

Količine sjemena i razmak biljaka - Gnojenje

| Veličina | kg/ha | 75 cm humak |
|--------------|-------|-------------|
| 28/35 mm | 1.000 | 26-28 |
| 35/45 mm | 1.700 | 31-33 |
| 45/50 mm | 2.250 | 35-37 |
| 35/50 mm | 2.000 | 33-35 |
| 50/60 mm rez | 2.100 | 33-35 |

Uvijek brojite količinu gomolja! Teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje..

Gnojivo

| | % usporedno s standardom | Primjena | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 st | 2 nd | 3 th |
| N | 110 | 4/4 | | |
| P ₂ O ₅ | 100 | 4/4 | | |
| K ₂ O | 100 | 4/4 | | |

- Uzgajano na svim vrstima tla.
- Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
- Tretman protiv srebrne krastavosti je poželjan.
- Poželjan je tretman protiv Rhizoctonije tijekom sadnje.
- Spriječite kondenzaciju prije i tijekom sadnje kako biste izbjegli kontaminaciju.
- Posadite 1 cm ispod površine.



- Započnite prskanje protiv Phytophthore pri 80% nicanja.

- Desikacija ne stvara probleme.

- Budite oprezni s matičnim gomoljima i spriječite oštećenja tijekom vađenja.
- Pričekajte s vađenjem dok pokožica ne sazrije.
- Pazite na ventilaciju u skladištu sve dok se ne osuše krumpiri. Pri dužim skladištenjima držati do 4-5C tek zagrijavanje prije korištenja na 14-15C.