



Stolna sorta

- ✓ Srednje kasna žute boje mesa
- ✓ Perfektne, ujednačene veličine
- ✓ Kulinarski tip A
- ✓ Otporna na PVY
- ✓ PCN otpornost (Ro1, Ro2/3)
- ✓ Otpornost Bradavičavosti (f1 and f6)



Karakteristike

Fiziologija

Boja pokožice	Žuta
Boja mesa	Žuta
Oblik gomolja	Ovalno/okrugli
Ujednačenost oblika gomolja	7
% 35/65	61%
Gomolji po biljci	10
Dubina okaca	6
Grupa zrenja	5,8
Dormantnost	8
Skladištenje	8
Indeks modrica (0-50)	3
Mehanička oštećenja	6
Šuplje srce gomolja	8

Prinos - Kvaliteta

Relativni prinos	100
Sadržaj suhe tvari (UWW)	19,7% (359)
Kulinarski tip	A
Nakon kuhanja, promjena boje	7
Boja pečenja nakon vađenja	4
Boja pečenja nakon skladištenja	3

Otpornosti

Plamenjača lista	5,8
Plamenjača gomolja	8,3
Obična krastavost	6,2
Prašna krastavost	8
Globodera Ro 1 (A)	9
Spraing (TRV)	6,2
Virus Y	8

Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

Količine sjemena i razmak biljaka - Gnojenje

Veličina	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.200	23-25
35/45 mm	2.200	27-29
45/50 mm	3.100	31-33
35/50 mm	2.500	28-30
50/60 mm rez	2.600	28-30

Uvijek brojite količinu gomolja! Teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje.

Gnojivo

	% usporedba s standard	Primjena		
		1 st	2 nd	3 th
N	100	4/4		
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Izbjeći tla gdje krastavost može biti problem.
- Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
- Poželjan je tretman protiv Rhizoctonije tijekom sadnje.
- Spriječite kondenzaciju prije i tijekom sadnje kako biste izbjegli kontaminaciju.

- Započnite prskanje protiv Phytophthore pri 80% nicanja.

- Desikacija ne stvara probleme.

- Budite oprezni s matičnim gomoljima i spriječite oštećenja tijekom vađenja.
- Pričekajte s vađenjem dok pokožica ne sazrije.
- Paziti na skladištenje dok nisu dovoljno suhi krumpiri, čuvanje tijekom dugog skladištenja na 4-5°C, postupno zagrijavanje prije upotrebe(14-15°C)