



## Organska stolna sorta

- ✓ Srednje rana stolna sorta
- ✓ Tamnožuto meso
- ✓ Visoka otpornost na Phytophthoru
- ✓ Dobra skladiivost i dug rok trajanja
- ✓ PCN otpornost (Ro1)
- ✓ Otpornost na bradavičavost (f1)



## Karakteristike

### Fiziologija

Boja pokožice	Žuta
Boja mesa	Tamno Žuta
Oblik gomolja	Dugi oval/ovalni
Ujednačenost gomolja	7
% 35/65	92%
Gomolji po biljci	13

Grupa zrenja	6,5
Dormantnost	9
Indeks modrica (0-50)	2
Mehanička oštećenja	7
Šuplje srce gomolja	7

### Prinos - Kvaliteta

Relativni prinos	87
Sadržaj suhe tvari (UWW)	19,5 %(355)
Kulinarški tip	A
Nakon kuhanja, promjena boje	7
Boja prženja nakon vađenja	4
Boja prženja nakon skladištenja	4

### Otpornosti

Plamenjača lista	9,5
Obična krastavost	5,5
Prašna krastavost	7
Globodera Ro 1 (A)	9
Bradavičavost f1 (D1)	10
Smeđa mrljavost (TRV)	7,2
Virus Y	5,5

## Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

### Količine sjemena i razmak biljaka - Gnojenje

Veličina gomolja	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.150	21-23
35/45 mm	2.250	25-27
45/50 mm	3.200	28-30
35/50 mm	2.500	26-28
50/60 mm rez	2.600	26-28

Uvijek brojite količinu gomolja! Teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje.

Gnojidba	% usporedba s standard.	Primjena		
		1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>th</sup>
N	100	3/4	1/4	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4		
K <sub>2</sub> O	100	4/4		



- Dugo mirovanje. Sjeme čuvajte na temperaturi ne nižoj od 6°C. Gomolje rano izvadite iz hladnjače..
- Izbjegavajte tla sklona bradavičavosti i tla osjetljiva na Rhizoctoniu.
- Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
- Spriječite kondenzaciju prije i tijekom sadnje kako biste izbjegli kontaminaciju.
- Koristite navodnjavanje kako biste spriječili bradavičavost.
- Druga primjena N-gnojiva oko tuberizacije.
- Desikacija ne predstavlja problem.
- Budite oprezni s oštećenjima gomolja tijekom vađenja.
- Pričekajte s vađenjem dok pokožica ne sazrije.
- Nakon vađenja pažnja na ventilaciju dok se krumpir ne osuši. postupno hladiti tokom dužeg skladištenja 4-5C, za transport postupno zagrijavati 12-15C