




Stolna sorta

- ✓ Srednje rana sorta
- ✓ Visok prinos, krupni gomolji
- ✓ Skladištenje na duži rok
 - ✓ Otpornost na bradavičavost
 - ✓ Pogodan za Mediteransko područje



Karakteristike

Fiziologija

Boja pokožice	Žuta
Boja mesa	Svijetložuta
Oblik gomolja	Ovalno izduženi
Ujednačenost oblika gomolja	6
% 35/65	42%
Gomolji po biljci	10
Dubina okaca	8
Grupa zrenja	6,2
Dormantnost	8
Skladištenje	8
Indeks modrica (0-50)	9
Mehanička oštećenja	8

Prinos - Kvaliteta

Relativni prinos	90
Sadržaj suhe tvari (UWW)	21,2% (390)
Kulinarski tip	BC
Nakon kuhanja, promjena boje	8
Boja pečenja nakon vađenja	7
Boja pečenja nakon skladištenja	7

Otpornosti

Plamenjača lista	5
Plamenjača gomolja	8
Obična krastavost	6,4
Prašna krastavost	4

Savjeti za uzgoj (konzumne kulture)

Količine sjemena i razmak biljaka – Gnojenje

Veličina	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.400	21-23
35/45 mm	2.800	25-27
45/50 mm	4.100	29-31
35/50 mm	3.300	27-29
50/60 mm rez	3.400	27-29

Gnojivo	% usporedno s standard	Primjena		
		1 st	2 nd	3 th
N	95	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		



- Najbolji rezultati se postižu sadnjom u fazi bijelih vrlo malih klica.
- Malo osjetljiv na Metribuzin. Koristiti samo prije nicanja i s niskom dozom.

- Druga primjena N-gnojiva dati oko tuberizacije.
- Započnite prskanje protiv Phytophtore pri 80% nicanja.
- Kako biste izbjegli krastavost, započnite s navodnjavanjem na vrijeme.

- Na vrijeme započnite preventivno prskanje protiv Alternarie.

- Desikacija ne stvara probleme.

- Pričekajte s vađenjem dok pokožica ne sazrije.
- Pažljivo vadite kako biste spriječili oštećenja tijekom vađenja kao i oštećenja i probleme tijekom skladištenja.
- Nakon vađenja pobrinite se za dobru ventilaciju u skladištu dok se krumpir ne osuši.