

ULTRA



Stolna sorta

- Srednje rana grupa zriobe
- Visok prinos i krupni gomolji
- Skladištenje na duž rok

- Pogodan za područje Mediterana



Osobine

Fiziologija

Boja pokožice	Žuta
Boja mesa gomolja	Svijetlo žuta
Oblik gomolja	Ovalan, izduženo ovalan
Ujednačenost oblika gomolja	6
% 35/65	42%
Broj gomolja po busu	10
Dubina okaca	8
Zrioba	6.2
Dormantnost	8
Skladištenje	8
Modrice gomolja(0-50)	9
Mehanička oštećenja	8

Prinos - kvalitet

Relativni prinos	90
Sadržaj suhe tvari (UWW)	21.2 (390)
Tip kuhanja	BC
Promjena boje kuhanjem	8
Boja pečenja nakon vađenja	7
Boja pečenja nakon skladištenja	7

Rezistentnost

Plamenjača lista	2.1
Plamenjača gomolja	9.0
Krastavost	6.4
Prašinasta krastavost	4
Globodera Ro 1 (A)	9
Bradavičatost f1 (D1)	10
Mrljavost gomolja (TRV)	6.3
Virus Y	6.5

Proizvodnja

□+ Količina sjemena i sklop - gnojidba

Veličina gomolja	kg/ha	75 cm humak
28/35 mm	1.400	21-23
35/45 mm	2.800	25-27
45/50 mm	4.100	29-31
35/50 mm	3.300	27-29
50/60 mm cut	3.400	27-29

Uvijek brojiti količinu gomolja! Teža zla zahtjevaju gušći sklop. □

Gnojidba	%u usporedbi standardom	Aplikacija		
		1	2	3
N	95	3/4	1/4	
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	100	4/4		

- Izbjegavati proizvodnju na teškim glinastim tlima.
- Najbolje je saditi u stadiju veoma male još bijele klice.
- Neznatno je osjetljiv na Metribuzin (Sencor). Koristiti niske doze kada je usjev nešto odmakao u vegetaciji.

- Druga aplikacija N-gnojiva ide u stadiju zametanja gomolja.
- Započeti sa tretiranjem protiv Phytophthore kod 80% ponika.
- Pravovremeno započeti sa navodnjavanjem radi sprječavanja pojave krastavosti.

- Pravovremeno započeti sa preventivnim tretiranjem protiv Alternarie.

- Desikacija ne predstavlja problem.

- Sa vađenjem započeti kada je pokožica dozorila.
- Vađenje provesti pažljivo zbog izbjegavanja oštećenja gomolja, modrica na gomolju i ev. problema tokom skladištenja,
- Nakon vađenja obratiti pažnju na dobru ventiliranost skladišta sve dok se gomolji ne osuše.

